

Das Newton-Verfahren

Prinzip:

Näherungsweise Bestimmung von Nullstellen durch wiederholtes Anzielen mit Tangenten.

Beispiel 1


Bestimme die Nullstelle von $f(x) = x^3 + x - 1$ auf **zehn** Nachkommastellen genau **ohne** Verwendung des *zero*-Befehls.

0. Schritt:

Wähle eine grobe Näherung x_0 mit Hilfe des Graphen: $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$

1. Schritt:

Ziele mit der Tangente t_1 von der Stelle x_0 aus auf die x-Achse. Berechne die Nullstelle x_1 dieser Tangente t_1 als verbesserte Näherung:



2. Schritt:

Ziele nun von x_1 aus mit der Tangente t_2 erneut auf die x-Achse:

·
·
·

n. Schritt:

Wiederhole das Verfahren so oft, bis _____

_____:

GTR-Eingabe:

Ergebnis:

Schritt n	Näherung x_n
0	
1	
2	
4	
5	
6	

Beispiel 2

Bestimme die **beiden** Nullstellen von $f(x) = 3^x - 3 \cdot 2^x + 1$ auf **zehn** Nachkommastellen genau mit dem Newton-Verfahren.

Schritt n	Näherung x_n
0	
1	
2	
4	
5	

Schritt n	Näherung x_n
0	
1	
2	
4	
5	


Beispiel 3

Bestimme die Nullstelle von $f(x) = 60x^3 - 90x^2 + 44,55x - 7,24$ auf **zehn** Nachkommastellen genau mit dem Newton-Verfahren und dem Startwert $x_0 = 0,5$

Schritt n	Näherung x_n
1	
2	
3	
4	
5	

Schritt n	Näherung x_n
6	
7	
8	
9	
10	

Bei der Wahl des Startwertes $x_0 = 0,5$ treten in Beispiel 3 Komplikationen auf. Skizzieren Sie den Graphen mit Hilfe des GTR im Bereich $0,4 \leq x \leq 0,7$ bzw. $-0,2 \leq y \leq 0,2$ und erklären sie das Verhalten des Newton-Verfahrens zeichnerisch.



Erklären Sie das Verhalten des Newton-Verfahrens in Beispiel 3 rechnerisch an Hand der Formel $x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$. **Hinweis:** Welchen Wert darf die Ableitung $f'(x_{n-1})$ im Nenner der Formel **auf keinen Fall** annehmen?

Fazit:

Zwischen der gesuchten Nullstelle und dem Startwert darf die Ableitung nicht _____ werden!

Das Newton-Verfahren

Prinzip:

Näherungsweise Bestimmung von Nullstellen durch wiederholtes Anzielen mit Tangenten.

Beispiel 1


Bestimme die Nullstelle von $f(x) = x^3 + x - 1$ auf **zehn** Nachkommastellen genau **ohne** Verwendung des *zero*-Befehls.

0. Schritt:

Wähle eine grobe Näherung x_0 mit Hilfe des Graphen: $x_0 = 0,8$

1. Schritt:

Ziele mit der Tangente t_1 von der Stelle x_0 aus auf die x-Achse. Berechne die Nullstelle x_1 dieser Tangente t_1 als verbesserte Näherung:



Tangentensteigung = Ableitung

$$\frac{f(x_0) - 0}{x_0 - x_1} = f'(x_0) \quad | \cdot (x_0 - x_1)$$

$$f(x_0) = (x_0 - x_1) \cdot f'(x_0) \quad | : f'(x_0)$$

$$\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = x_0 - x_1 \quad | + x_1; - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

2. Schritt:

Ziele erneut von x_1 aus mit der Tangente t_2 auf die x-Achse:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

n. Schritt:

Wiederhole das Verfahren so oft, bis sich die ersten zehn Nachkommastellen nicht mehr ändern:

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

GTR-Eingabe:

0,8 ENTER

Ans - Y1(Ans)/nDeriv(Y1,X,Ans) ENTER

Ergebnis:

Schritt n	Näherung x_n
0	0,8
1	0,6931507215
2	0,6824270597
4	0,6823278123
5	0,6823278038
6	0,6823278038

Beispiel 2

Bestimme die **beiden** Nullstellen von $f(x) = 3^x - 3 \cdot 2^x + 1$ auf **zehn** Nachkommastellen genau mit dem Newton-Verfahren.

Schritt n	Näherung x_n
0	2,5
1	2,571254098
2	2,566711468
4	2,566691609
5	2,566691609

Schritt n	Näherung x_n
0	-1,5
1	-1,248379962
2	-1,263520993
4	-1,263579098
5	-1,263579098


Beispiel 3

Bestimme die Nullstelle von $f(x) = 60x^3 - 90x^2 + 44,55x - 7,24$ auf **zehn** Nachkommastellen genau mit dem Newton-Verfahren und dem Startwert $x_0 = 0,5$

Schritt n	Näherung x_n
1	0,5777881495
2	0,5336152097
3	0,6234665286
4	0,5832013627
5	0,5428587616

Schritt n	Näherung x_n
6	0,7141634416
7	0,6465232006
8	0,6003062135
9	0,5632662775
10	0,4829650956

Bei der Wahl des Startwertes $x_0 = 0,5$ treten in Beispiel 3 Komplikationen auf. Skizzieren Sie den Graphen mit Hilfe des GTR im Bereich $0,4 \leq x \leq 0,7$ bzw. $-0,2 \leq y \leq 0,2$ und erklären sie das Verhalten des Newton-Verfahrens zeichnerisch.



Erklären Sie das Verhalten des Newton-Verfahrens in Beispiel 3 rechnerisch an Hand der Formel $x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$. **Hinweis:** Welchen Wert darf die Ableitung $f'(x_{n-1})$ im Nenner der Formel **auf keinen Fall** annehmen?

Fazit:

Zwischen der gesuchten Nullstelle und dem Startwert darf die Ableitung nicht Null werden!