

5.4. Prüfungsaufgaben zu Ableitungsregeln

Aufgabe 1: Potenz- und Exponentialfunktionen im Vergleich (6)

Vergleichen Sie die Schaubilder der Funktionen $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2^x$ sowie ihrer Umkehrfunktionen f^{-1} und g^{-1} im Hinblick auf Definitionsbereiche, Wertebereiche, Asymptoten, Achsenschnittpunkte, Ableitungen und Extrempunkte anhand der untenstehenden Tabelle

Funktion	$f(x) = x^2$	$f^{-1}(x) =$	$g(x) = 2^x$	$g^{-1}(x) =$
D =				
W =				
Asymptoten				
Achsenschnittpunkte				
Extrema				
Ableitung	$f'(x) =$	$f^{-1}'(x) =$	$g'(x) =$	$g^{-1}'(x) =$

Lösung

Funktion	$f(x) = x^2$	$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$	$g(x) = 2^x$	$g^{-1}(x) = \log_2(x)$
D =	\mathbb{R}	$[0; \infty[$	\mathbb{R}	$]0; \infty[$
W =	$[0; \infty[$	$[0; \infty[$	$]0; \infty[$	\mathbb{R}
Asymptoten	-	-	$y = 0$ für $x \rightarrow -\infty$	$x = 0$ für $y \rightarrow -\infty$
Achsenschnittpunkte	S(0 0)	S(0 0)	S(0 1)	S(1 0)
Extrema	T(0 0)	-	-	-
Ableitung	$f'(x) = 2x$	$f^{-1}'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$g'(x) = \ln(2) \cdot 2^x$	$g^{-1}'(x) = \frac{1}{\ln 2 \cdot x}$

Aufgabe 2: Potenz- und Exponentialfunktionen im Vergleich (6)

Vergleichen Sie die Schaubilder der Funktionen $f(x) = x^3$ und $g(x) = 3^x$ sowie ihrer Umkehrfunktionen f^{-1} und g^{-1} im Hinblick auf Definitionsbereiche, Wertebereiche, Asymptoten, Achsenschnittpunkte, Ableitungen und Extrempunkte anhand der untenstehenden Tabelle.

Funktion	$f(x) = x^3$	$f^{-1}(x) =$	$g(x) = 3^x$	$g^{-1}(x) =$
D =				
W =				
Asymptoten				
Achsenschnittpunkte				
Extrema				
Ableitung	$f'(x) =$	$f^{-1}'(x) =$	$g'(x) =$	$g^{-1}'(x) =$

Lösung

Funktion	$f(x) = x^3$	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$	$g(x) = 3^x$	$g^{-1}(x) = \log_3(x)$
D =	\mathbb{R}	$]0; \infty[$	\mathbb{R}	$]0; \infty[$
W =	\mathbb{R}	$]0; \infty[$	$]0; \infty[$	\mathbb{R}
Asymptoten	-	-	$y = 0$ für $x \rightarrow -\infty$	$x = 0$ für $y \rightarrow -\infty$
Achsenschnittpunkte	S(0 0)	S(0 0)	S(0 1)	S(1 0)
Extrema	-	-	-	-
Ableitung	$f'(x) = 3x^2$	$f^{-1}'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$	$g(x) = \ln(3) \cdot 3^x$	$g^{-1}'(x) = \frac{1}{\ln 3 \cdot x}$

Aufgabe 3: Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion (4)

Berichten Sie kurz anhand einer Skizze über die wichtigsten Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion $\exp(x)$.

Lösung

$$D = \mathbb{R}, W = \mathbb{R}^+, \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0, \exp'(x) = \exp(x) \quad (4)$$

Aufgabe 4: Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion (4)

Berichten Sie kurz anhand einer Skizze über die wichtigsten Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion $\ln(x)$.

Lösung

$$D = \mathbb{R}^+, W = \mathbb{R}, \ln x \rightarrow -\infty \text{ für } x \rightarrow 0^+, \ln'(x) = \frac{1}{x} \quad (4)$$

Aufgabe 5: Kettenregel

Bilden Sie die Ableitung und vereinfachen Sie soweit wie möglich:

- $f(x) = e^{-x^2+x}$
- $f(x) = e^{x^2-x}$
- $f(x) = \exp(3x^4 - \sqrt{x})$
- $f(x) = (\sin(x))^5$
- $f(x) = (\cos(x))^5$
- $f(x) = [3x^4 - \sin(x)]^{38}$

Lösungen

- $f'(x) = (-2x + 1) \cdot e^{-x^2+x}, \quad (2)$
- $f'(x) = (-2x + 1) \cdot e^{x^2-x}, \quad (2)$
- $f'(x) = (12x^3 - \frac{1}{2\sqrt{x}}) \exp(3x^4 - \sqrt{x}) \quad (2)$
- $f'(x) = -5 \cdot \sin(x) \cdot (\cos(x))^4 \quad (2)$
- $f'(x) = 5 \cdot \cos(x) \cdot (\sin(x))^4 \quad (2)$
- $f'(x) = 38(12x^3 - \cos(x))(3x^4 - \sin(x))^{37} \quad (2)$

Aufgabe 6: Produktregel (6)

Bilden Sie die Ableitung und vereinfachen Sie soweit wie möglich:

- $f(x) = x \cdot e^x$
- $f(x) = (2x + 1) \cdot \ln x$
- $f(x) = (x^2 - 1) \cdot \sin(x)$
- $f(x) = (x^2 + 1) \cdot \cos(x)$
- $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$

Lösungen

- a) $f'(x) = (1+x) \cdot e^x$, (2)
b) $f'(x) = 2 \cdot \ln x + 2 + \frac{1}{x}$ (2)
c) $f'(x) = -2x \cdot \sin(x) + (x^2 - 1) \cdot \cos(x)$ (2)
d) $f'(x) = 2x \cdot \cos(x) - (x^2 + 1) \cdot \sin(x)$ (2)
e) $f'(x) = (\cos(x))^2 - (\sin(x))^2$ (2)

Aufgabe 7: Ketten- und Produktregel

Bilden Sie die Ableitung und vereinfachen Sie soweit wie möglich:

- a) $f(x) = x \cdot \sqrt{x^3 - 1}$
b) $f(x) = x \cdot \sqrt{x^5 - 1}$
c) $f(x) = x \cdot e^{-x}$
d) $f(x) = (1+x) \cdot e^{2x-1}$
e) $f(x) = (1-x) \cdot e^{2x+1}$
f) $f(x) = x^3 \cdot e^{2x}$
g) $f(x) = 3x \cdot e^{-x+1}$
h) $f(x) = (2x+1) \cdot e^{-2x}$
i) $f(x) = \frac{e^{2x} + 1}{e^x}$
j) $f(x) = e^x \cdot \cos(2x+3)$

Lösungen

- a) $f'(x) = \sqrt{x^3 - 1} + \frac{3x^3}{2\sqrt{x^3 - 1}}$ (2)
b) $f'(x) = \sqrt{x^5 - 1} + \frac{5x^5}{2\sqrt{x^5 - 1}}$ (2)
c) $f'(x) = (x-1) \cdot e^{-x}$, (2)
d) $f'(x) = (2x+3) \cdot e^{2x-1}$, (2)
e) $f'(x) = (1-2x) \cdot e^{2x-1}$, (2)
f) $f'(x) = (3x^2 + 2x^3) e^{2x}$ (2)
g) $f'(x) = 3(1-x) \cdot e^{-x+1}$ (2)
h) $f'(x) = 2 \cdot e^{-2x} + (2x+1) \cdot (-2) \cdot e^{-2x} = -4x \cdot e^{-2x}$. (2)
i) $f(x) = e^x - e^{-x} \Rightarrow f'(x) = e^x + e^{-x}$ (2)
j) $f'(x) = e^x [\cos(2x+3) - 2\sin(2x+3)]$ (2)

Aufgabe 8: Quotientenregel

Bilden Sie die Ableitung und vereinfachen Sie soweit wie möglich:

- a) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$
b) $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$
c) $f(x) = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$
d) $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1}$

Lösungen

a) $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$

b) $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$

c) $f'(x) = \frac{-2(x^2+x+1)}{(x^2-1)^2}$

d) $f'(x) = \frac{2x^2+2x-2}{(x^2+1)^2}$

Aufgabe 9: Kettenregel beim beschränkten Wachstum (3)

Gegeben ist die Funktion f durch $f(x) = 6 - 4 \cdot e^{-0,5x}$.

- Geben Sie die Gleichung der Asymptoten an.
- Zeigen Sie, dass f streng monoton wachsend ist.
- Skizzieren Sie das Schaubild von f einschließlich der Asymptote.

Lösungen

- Asymptote $y = 6$ für $x \rightarrow +\infty$ (1)
- f ist streng monoton wachsend, da $f'(x) = 2e^{-0,5x} > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (1)
- Schaubild mit Asymptote (1)

Aufgabe 10: Kettenregel beim beschränkten Wachstum (3)

Gegeben ist die Funktion f durch $f(x) = 3 - 2 \cdot e^{-2x}$.

- Geben Sie die Gleichung der Asymptoten an.
- Zeigen Sie, dass f streng monoton wachsend ist.
- Skizzieren Sie das Schaubild von f einschließlich der Asymptote.

Lösungen

- Asymptote $y = 3$ für $x \rightarrow +\infty$ (1)
- f ist streng monoton wachsend, da $f'(x) = 4e^{-2x} > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (1)
- Schaubild mit Asymptote (1)

Aufgabe 11: Ketten- und Produktregel bei einer Wurzelfunktion(10)

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2x \sqrt{1-x^2}$. Ihr Graph heißt G .

Geben Sie den maximalen Definitionsbereich von f an. Untersuchen Sie G auf Symmetrie, Achsenschnittpunkte, Extrem- und Wendepunkte. Berechnen Sie $f'(0)$ und skizzieren Sie G .

Lösungen

$D = [-1; 1]$ (1)

Symmetrie zum Ursprung, da $f(-x) = -f(x)$ (1)

Achsenschnittpunkte $S_{x1}(0 | 0)$ und $S_{x2/3}(\pm 1 | 0)$ (1)

1. Ableitung: $f'(x) = 2\sqrt{1-x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2-4x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ (1)

2. Ableitung $f''(x) = \frac{-8x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{4x^3-2x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{8x^3-8x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} - \frac{4x^3-2x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{4x^3-6x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$ (1)

Extrempunkte $H(\frac{1}{2}\sqrt{2} | 1)$ und $T(-\frac{1}{2}\sqrt{2} | -1)$ (NST von f' mit VZW von + nach - bzw. umgekehrt) (2)

Wendepunkt $W(0 | 0)$ (NST von f'' mit VZW) (1)

$f'(0) = 2$ und Skizze (2)